# CASINO ROYALE

**SKUPINA 7,11 FUNGICIDI**

Močljiva zrnca (WG)

Fungicid za zatiranje glivičnih bolezni kot glavna uporaba v sladkorni pesi ter pod pogoji manjše uporabe v rdeči pesi, gomoljni zeleni, pastinaku, in peteršilju za koren, vrtni in črni redkvi, hrenu, rumeni kolerabi, strniščni repi, cikoriji (za koren), črnem korenu, šalotki, jajčevcih ter okrasnih rastlinah.

**Vsebuje:**

- boskalid, 267 g/kg oz. 26,7 % w/w
  CAS št.: 188425-85-6
- piraklostrobin 67g/kg oz. 6,7 % w/w
  CAS št.: 175013-18-0

Pozor

Povzroča hudo draženje oči. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Nositi zaščito za oči in zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Prestreči razlito tekočino. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju gojenih rastlin (razen pastinaka in peteršilja za koren) upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju pastinaka in peteršilja za koren upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

**Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!**

**V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.**

**Zastopa:** Picount d.o.o., Mošnje 2c, 4240 Radovljica, Slovenija Tel: 08 205 32 00, www.picount.si, info@picount.si

**Prodaja:** Picount d.o.o., Mošnje 2c, 4240 Radovljica, in Metrob d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubečna

**Vsebina: …. kg**

**Skladiščenje:** Sredstvo hraniti v originalni, zaprti embalaži, zaščiteno pred svetlobo in vlago, v dobro prezračenih prostorih pri temperaturi 5-30 °C, v skladiščih, ki ustrezajo s slovensko zakonodajo predpisanim normativom za skladiščenje nevarnih kemikalij. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil in ne na neposredni sončni svetlobi.

**Osnovna odločba** o registraciji št. U34330-72/2022/10 z dne _____ Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z vsemi spremembami.

**Datum proizvodnje, kontrolna številka formulacije in datum poteka roka uporabe so natisnjeni na embalaži.**

**Imetnik registracije/Proizvajalec:** Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400056, Mumbai, Indija, ki ga v Evropski uniji zastopa Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina no 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Španija

**Rok uporabe:** 2 leti

® zaščiteno ime podjetja Sharda Cropchem Limited

**Pred uporabo preberite priloženo navodilo!**

**SREDSTVO SE SME PRODAJATI SAMO OB PREDLOŽITVI POTRDILA O PRIDOBITVI ZNANJ IZ FITOMEDICINE.**

**Način delovanja**: Sredstvo CASINO ROYALE je lokalno sistemičen fungicid in vsebuje dve aktivni snovi, *boskalid* in *piraklostrobin*. *Boskalid* deluje sistemično, po nanosu se po rastlini razporedi v 48 urah. Aktivna snov *piraklostrobin* pripada skupini strobilurinov. Deluje mezosistemično in ima delno izraženo translaminarno delovanje.

**Uporaba:** Sredstvo CASINO ROYALE se uporablja v:

- **sladkorni pesi**, gojeni na prostem, za zatiranje **pesne listne pegavosti (*Cercospora beticola*)** v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se tretira od razvojne faze začetka olistavanja do faze, ko listi pokrijejo 90% površine tal (BBCH 31-39).

**Fitotoksičnost:** Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodilom za uporabo, ni fitotoksično za gojene rastline.

MANJŠE UPORABE:
Sredstvo CASINO ROYALE se kot manjša uporaba uporablja v/na:

- **rdeči pesi**, gojeni na prostem, za zatiranje **pesne pepelaste plesni (*Erysiphe betae*)** v odmerku 1 kg/ha pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se tretira od razvojne faze pojava petega lista do faze, ko koren pese doseže velikost primerno za pobiranje (BBCH 15-49).
- **gomoljni zeleni**, gojeni na prostem, za zatiranje **bele gnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*)** v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se tretira od razvojne faze pojava petega lista do faze konca rasti gomolja (BBCH 15-49).
- **pastinaku in peteršilju za koren**, gojenih na prostem, za zatiranje **črnih listnih pegavosti (*Alternaria* spp.)** in **pepelovke kobulnic (*Erysiphe heraclei*)** v odmerku 0,75 kg/ha pri porabi vode 600 do 800 L/ha. S sredstvom se tretira od razvojne faze pojava petega lista do faze konca rasti korena (BBCH 15-49).
- **vrtni in črni redkvi**, gojenih na prostem, v odmerku 1,5 kg/ha za zatiranje **sive plesni (*Botrytis cinerea*)** pri porabi vode 600 do 800 L/ha in **bele noge krompirja (padavice sadik) (*Rhizoctonia solani*)** pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se zoper sivo plesen tretira od razvojne faze pojava prvega lista do faze konca rasti korena redkve (BBCH 11-49). S sredstvom se zoper belo nogo krompirja tretira od razvojne faze pojava prvega lista do faze pojava drugega lista (BBCH 11-12).
- **hrenu**, gojenem na prostem, za zatiranje **plesni (*Peronospora* spp.), črnih listnih pegavosti (*Alternaria* spp.)** in **pepelovk (*Erysiphe* spp.)** v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se tretira od razvojne faze pojava petega lista do faze konca rasti korenine (BBCH 15-49).
- **rumeni kolerabi**, gojeni na prostem, za zatiranje **plesni (*Peronospora* spp.), črnih listnih pegavosti (*Alternaria* spp.)** in **pepelovk (*Erysiphe* spp.)** v odmerku 1 kg/ha pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se tretira od razvojne faze pojava petega lista do faze konca rasti korena (BBCH 15-49).
- **strniščni repi**, gojeni na prostem, za zatiranje **sive plesni (*Botrytis cinerea*)** in **bele noge krompirja (padavice sadik) (*Rhizoctonia solani*)** v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se tretira od razvojne faze pojava prvega lista do faze konca rasti korena (BBCH 11-49).
- **cikoriji (za koren)**, gojeni na prostem, za zatiranje **črnih listnih pegavosti (*Alternaria* spp.)** in **rij (*Puccinia* spp.)** v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se tretira od razvojne faze pojava tretjega lista do faze 70% pričakovane velikosti korenine (BBCH 11-47).
- **črnem korenu**, gojenem na prostem, za zatiranje **sive plesni (*Botrytis cinerea*), bele gnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*)** in **bele noge krompirja (padavice sadik) (*Rhizoctonia solani*)** v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se tretira oob prvem pojavu znakov bolezni, od razvojne faze začetkarasti korena, do faze konca rasti korena (BBCH 41-49).
- **šalotki**, gojeni na prostem, za zatiranje **čebulne plesni (*Peronospora destructor*), črnih listnih pegavosti (*Alternaria* spp.)** in **rjavih pegavosti (*Stemphylium* spp.)** v odmerku 1 kg/ha pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se tretira od razvojne faze pojava tretjega lista do faze upognjenih 50% listov (BBCH 13-48).
- **jajčevcih**, gojenih na prostem, za zatiranje **krompirjeve plesni (*Phytophthora infestans)** v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi vode 300 do 600 L/ha. S sredstvom se tretira ob prvem pojavu znakov bolezni, od pojava stranskih poganjkov do faze konca zorenja (BBCH 20-87).

- **okrasnih rastlinah**, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje **sive plesni (*Botrytis cinerea*)**, **bele gnilobe (*Sclerotinia sclerotiorum*)**, **bele noge krompirja (padavice sadik) (*Rhizoctonia solani*)**, **črnih listnih pegavosti (*Alternaria* spp.)** in **pepelovk (*Erysiphe* spp.)** v odmerku 0,1-0,18 kg/ha pri porabi vode 100 L/ha. S sredstvom se tretira od razvojne faze pojava tretjega lista do faze pojava socvetja (BBCH 13-47).

Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva CASINO ROYALE pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva CASINO ROYALE na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

**Opozorila:** S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ enkrat v eni rastni sezoni, razen okrasne rastline, ki se jih lahko tretira največ dva krat v eni rastni sezoni, v razmaku 7 dni. Listje tretiranih rastlin ni dovoljeno uporabljati za hrano ali krmo.

**Antirezistentna strategija:** Sredstvo CASINO ROYALE vsebuje aktivni snovi *boskalid* in *piraklostrobin*. *Boskalid* pripada skupini piridin karboksamidov (SKUPINA 7), *piraklostrobin* pa skupini metoksikarbamatov (SKUPINA 11). Dodatne informacije so na voljo na www.frac.info. Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja.

**Mešanje:** V primeru mešanja z drugimi sredstvi se je pred uporabo sredstva treba posvetovati z imetnikom registracije oz. zastopnikom za sredstvo. Imetnik registracije jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstva.

**Priprava sredstva za uporabo:** Prepričajte se, da je škropilnica čista in izpravna. Umerite škropilne šobe, da se zagotovi enakomeren nanos. Odmerjeno količino sredstva CASINO ROYALE najprej raztopite v manjši količini vode in nato vlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo trikrat do čistega sperite z vodo in vsebino zlijte v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnite rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujte, do porabe škropilne brozge. Za odmerjanje sredstva uporabljajte za ta namen namenjene merilne naprave. Ostanke sredstva razredčite z vodo v razmerju 1:10 in nanesite na že tretirano površino.

**Karenca:** Karenca za sladkorno peso, rdečo peso, gomoljno zeleno, pastinak, peteršilj za koren, vrtno in črno redkev, hren, rumeno kolerabo, strniščno repo, cikorijo (za koren), črni koren in šalotko je 14 dni. Karenca za jajčevce je 3 dni. Karenca za okrasne rastline ni potrebna.

**Opozorila za varovanje okolja:** Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

**Varstvo pri delu:** Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju oziroma čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), trpežno obutev ali gumijaste škornje, ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala.
Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico in med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in trpežno obutev ali gumijaste škornje.
Sladkorna pesa, rdeča pesa, gomoljna zelena, pastinak, peteršilj za koren, vrtna in črna redkev, hren, rumena koleraba, strniščna repa, cikorija (za koren), črni koren, šalotka: Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.
Jajčevec in okrasne rastline: Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaščitne (nitrilne) rokavice in zaprte čevlje.
**Delovna karenca:** Vstop delavcev na tretirano površino oziroma v tretiran prostor je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretirani površini posuši.
**Znaki zastrupitve:** V primeru zastrupitve se lahko pojavi splošna slabost, bruhanje, driska, krči v trebuhu in nespecifična sistemska toksičnost.

**Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:**
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom ter vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske

funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če se pojavijo znaki draženja kože, se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oči temeljito spere s počasnim curkom s čisto mlačno vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima in če to lahko stori brez težav. Nadaljuje se z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere s čisto vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzvati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.
Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).

**Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta:** Obvezna je uporaba zaščitne delovne obleke in obutve, po potrebi tudi zaščitne maske in dihalnega aparata. Nezaščitenim osebam je gibanje po področju izpusta prepovedano. Preprečimo širjenje sredstva v okolje, še posebej v vode. Razlito sredstvo in poškodovano embalažo zberemo in oddamo pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov. V zaprtem prostoru: Poškodovano embalažo in razsuto sredstvo zberemo v posebej označeno ustrezno posodo, ki jo dobro zaprto odložimo v zbirnik posebnih odpadkov pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Tla in ostale kontaminirane predmete po temeljitem čiščenju speremo z vodo. Večje količine odpadne vode zberemo v posode, da preprečimo onesnaževanje odvodnih kanalov, stoječih in tekočih voda. V primeru nesreče pri prevozu: Zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Preprečimo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru. O razlitju sredstva ali razlitju večje količine škropilne brozge je potrebno obvestiti Center za obveščanje na telefonsko številko 112. V primeru požara: Gasimo s $CO_2$, prahom, peno ali vodno meglo. Pri gašenju se izogibati uporabi vodnega curka. V primeru požara uporabljajte dihalni aparat in primerno zaščitno obleko, ker se pri gorenju lahko sproščajo toksični in dražilni hlapi.

**Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo:** Uporabnik odda prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov v skladu z zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo se sme odstraniti kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tako očiščeno embalažo pa se prepusti pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma se je odnese na zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo se ravna kot z nevarnim odpadkom. Prazne embalaže se ne sme ponovno uporabiti!

**Klavzula o jamstvu: CASINO ROYALE** se lahko uporablja le v skladu z navodilom na etiketi. Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja. Morebitna škoda ali slabše delovanje je lahko tudi posledica raznih lokalnih dejavnikov, kot so tip tal, sorte in vremenski pogoji, za katere proizvajalec prav tako ne more jamčiti.

**Osnovna odločba** o registraciji št. U34330-72/2022/10 z dne _____ Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z vsemi spremembami.

**Datum proizvodnje, kontrolna številka formulacije in datum poteka roka uporabe so natisnjeni na embalaži.**

**Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.**

**Navodilo za uporabo je v skladu z odločbo o registraciji.**

**Rok uporabe: 2 leti**